

AGROSETYL

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Componentes Ingredientes activos:	Concentración
Mancozeb	350 g/Kg
Fosetyl Aluminium ETU	350 g/Kg
Excipientes c.p.s.	1,5 g/Kg 1 Kilo

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Registro Nacional: 59-F3/NA-CL2

Contenido Neto: 1kg

Lote No.:
Fecha formulación:
Fecha vencimiento:
PVP:

Titular de Registro:

SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República.
Edificio: Centrum, Piso 5,
Teléfono: 023330555 / 025107482.
Quito - Ecuador.


Fabricado y Formulado por:



Sharda Cropchem Ltd

Domestic: H-10, 29th Road, Bandra(W), Mumbai - 400 050
Telt: +91 22 6678 2800
Fax: +91 22 6678 2828 / 6678 2808
E-mail: shardan@vsnl.com
Pais: INDIA

Importado y distribuido por:



"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO",
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión)

Causa irritación moderada a los ojos

Cuidado, evite el contacto, POSIBLE TERATOGENICO

Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENICO

Medidas relativas a la seguridad: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑO A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación.- lleve al paciente a un lugar aireado.

Instrucciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte no tiene antídoto específico.

En caso de contacto con la piel.- lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos.- lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión.- No induzca al vómito.

Instrucciones para el médico:

Síntomas: Alteraciones respiratorias, tos, disnea, aumento de las secreciones mucosas. En contacto con los ojos puede producir conjuntivitis, irritación y lagrimeo.

Tratamientos: Tratamiento sintomático.

Antídoto: No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda.



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1330 VENENO (836366)
Atención las 24 horas del día. SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: (02) 3330555
(QUITO). CISPROQUIM: 1800-593-005

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse. Después de usar el contenido, inutilízela cortando la funda, colóquela en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

Medidas relativas para la protección del medio ambiente

"Moderadamente tóxico para organismos acuáticos, no tóxico para abejas" "no contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación, sobrantes del producto y envases vacíos". "Para la aplicación de agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensibles tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano", no aplique con vientos fuertes para evitar la deriva "evite la escorrentía y escurrimiento". En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregados al gestor o distribuidor para su disposición final.

Instrucciones de uso y manejo: AGROSETYL es un fungicida que inhibe la germinación de las esporas al afectar el metabolismo de lípidos, la respiración y producción de ATP. Posee un efecto de sistema ascendente y descendente, es transportado fácil y rápidamente por toda la planta incluyendo los brotes que se forman después de ser aplicado el producto.

Modo de empleo: Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de AGROSETYL, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis*	PI:
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Lancha Negra (<i>Phytophthora infestans</i>)	2,5 g/l	80 días

*Volumen de Agua: 600 l/ha

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: AGROSETYL se aplica en tres ocasiones en un cultivo ya establecido, cuando se encuentre en crecimiento vegetativo a dos meses de la siembra.

REINGRESO: Esperar un mínimo de 24 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con otros fungicidas, sin embargo, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación si se requiere hacer la mezcla.

RESPONSABILIDAD: "El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO

