

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"Nocivo por ingestión"; "Nocivo en contacto con la piel"; "El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas".

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Usar camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón".

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de **inhalación**, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respire sin dificultad. En caso de **contacto con la piel**, retirese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de **contacto con los ojos** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de **ingestión**: No induzca el vómito.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Intoxicación aguda por exposición oral, dérmica e inhalatoria. Síntomas no específicos. Sin embargo puede presentarse náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal. Intoxicación crónica: No se han reportado casos en humanos. De acuerdo a los hallazgos con organismos de estudio, una exposición crónica puede generar alteraciones en el hígado y presencia de necrosis.

TRATAMIENTO: Seguir tratamiento sintomático y de soporte. En caso de ingestión se sugiere realizar un lavado gástrico, una purga salina o el suministro de carbón activado.

ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico.

"En caso de **intoxicación llame al médico inmediatamente**, o lleve el Paciente al médico y muéstrele la etiqueta".



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366)
Atención las 24 horas del día.
SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: (02) 3330555 (QUITO).
CISPROQUIM: 1800-593-005

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICION DE ENVASES VACIOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Producto persistente en el suelo, tiene un moderado potencial de lixiviación. No arroje los envases, ni los residuos del producto o de la aplicación al suelo, a fuentes de agua (ríos, acequias, lagos, lagunas) o al sistema de alcantarillado. No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No exceder el número de aplicaciones recomendadas. No aplicar cuando esté lloviendo, en horas soleadas ni cuando existan vientos fuertes. "Para aplicación aérea: Aplicar una franja de seguridad de 60 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano". "Para aplicación terrestre: Aplicar una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano". No permita la deriva de este producto, "Nocivo para organismos acuáticos", "No aplicar directamente al agua". Utilice equipo de aplicación en buen estado, para evitar pérdidas y derrames del producto. En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregadas al gestor autorizado.

CATAPLIN

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición	Concentración (g/l)
Azoxystrobin	250
Aditivos c.s.p.	11

Número de Registro Nacional: 77-F3/NA-CL1

CONTENIDO NETO: 1 litro

Nº Lote.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

PVP:

Titular de Registro:

SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República.
Edificio: Centrum, Piso 5.
Teléfono: 023330555 / 025107482.
Quito - Ecuador.



Fabricado y Formulado por:



Sharda Cropchem Ltd

Dominic Holm, 28th Road, Bandra(W), Mumbai - 400 050
Tel: + 91 22 6676 2800;
Fax: + 91 22 6676 2826 / 6676 2808
E-mail: shardam@vsnl.com
País: INDIA.

Importado y Distribuido por:



PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA

24-10-2017

INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN

MODO DE ACCIÓN: CATAPLIN es un fungicida de amplio espectro de acción sistémica.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibe la respiración mitocondrial mediante el bloqueo de la transferencia de electrones entre el citocromo b y citocromo c1, en el sitio de oxidante ubiquinol.

MODO DE EMPLEO: Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de CATAPLIN, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis (l/ha)	Periodo de Carencia
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.55	1 día
Rosas (<i>Rosa</i> sp.)	Mildíu polvoroso (<i>Oidium</i> sp.)	0.5	No Aplica
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Lancha tardía (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.1	7 días
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Añublo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	0.45	30 días

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Banano (*Musa acuminata* AAA): Se recomienda aplicar en forma preventiva o con el apareamiento de los primeros síntomas de la enfermedad (estadios 2 y 3, estado de pizca). El intervalo entre las aplicaciones depende del estado del cultivo, de las condiciones climatológicas y de la presión de la enfermedad, que se establece por el sistema de Preaviso Biológico. Se recomienda no aplicar en más de 3 ocasiones productos del mismo modo de acción.

Rosa (*Rosa* sp.): Aplicar según la dosis recomendada, cuando se verifique la presencia de la enfermedad (máximo 2% del área afectada), aplicar el fungicida en dos ocasiones con un intervalo de siete días.

Papa (*Solanum tuberosum*): Aplicar con la presencia de la enfermedad. Se recomienda hacer dos aplicaciones con intervalos de siete días.

Arroz (*Oryza sativa*): Aplicar en fase fenológica de desarrollo vegetativo como plaguicida sistémico con la presencia de la plaga, se recomienda hacer dos aplicaciones con intervalos de siete días.

PERÍODO DE REINGRESO:

Se debe reingresar en un periodo de 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con los productos comúnmente usados en los cultivos controlados, excepto con productos alcalinos. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación cuando se requiera mezclar con otro producto.

RESPONSABILIDAD:

"El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

II MODERADAMENTE PELIGROSO



DAÑINO

