

# ELEFANTE

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos Dispersables (WG)

Composición	Concentración
<b>Ingredientes Activos:</b> Folpet	600 g/Kg
Dimethomorph	113 g/Kg
Excipientes c.p.s	1 Kg

“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Registro Nacional: 203-F1/NA-CL2

Contenido Neto: 1 kg

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

PVP:



PLAGUICIDAS DE USO AGRICOLA

Fecha: 08/04/2011  
Titular de Registro:

SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República.  
Edificio: Centrum, Piso 5.  
Teléfono: 023330555 / 025107482.  
Quito – Ecuador.

Fabricado y Formulado por:



Sharda Cropchem Ltd

2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi  
Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056  
Teléfono: +912262615615  
E-mail: shardain@vsnl.com  
País: INDIA

Importado y Distribuido por:

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**Precaciones y advertencias de uso y aplicación:** Causa irritación moderada a los ojos. Causa irritación a la piel. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO

**Medidas relativas a la seguridad:** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑO A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

**Almacenamiento y manejo del producto:** Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

**Medidas relativas a primeros auxilios:** En caso de inhalación - Lleve al paciente a un lugar aireado. Instrucciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte no tiene antídoto específico. En caso de contacto con la piel - Lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos - lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión - No induzca el vómito.

**Síntomas:** En contacto con los ojos puede causar dolor, enrojecimiento y lágrimas. Irrita la piel y puede ocasionar alergias en algunas personas.

**Tratamientos:** Tratamiento sintomático.

**Antídoto:** No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

“En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda.”



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL 1800 VENENO (836366). Atención las 24 horas del día. SHARDA DEL ECUADOR CIA LTDA.: (02) 3330555 (Quito). CISPROQUIM: 1800-593-005

**Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

**Medidas relativas para la protección del medio ambiente:** “Altamente tóxico para organismos acuáticos”, “no contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación, sobrantes del producto y envases vacíos”. Aplicar una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensibles tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano, no aplique con vientos fuertes para evitar la deriva” “evite la escorrentía y escurrimiento”.

En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregados al gestor o distribuidor para su disposición final. “Producto moderadamente Tóxico para abejas. Para su protección: No permitir la deriva de este producto a cultivos o malezas en flor, si las abejas están visitando el área de tratamiento. Realizar aplicaciones en horas en que las abejas no se encuentren activas, esto es generalmente a partir de las últimas horas de la tarde (una hora antes de ponerse el sol). Alertar a los apicultores que se encuentren en un radio de 3 km, antes de iniciar las operaciones”.

**Instrucciones de uso y manejo:** MODO DE ACCIÓN: ELEFANTE es un fungicida sistémico con acción protectante y actividades antiesporulante. MECANISMO DE ACCIÓN: ELEFANTE es un fungicida que inhibe la formación de la pared celular de los hongos oomicetos. Evita la actividad de las enzimas sulfhidrasas con lo que se libera tiofosgeno, producto tóxico para el hongo, también interfiere la respiración y el transporte de electrones. MODO DE EMPLEO: Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de ELEFANTE, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga	Dosis *	PC
PAPA ( <i>Solanum tuberosum</i> )	LANCHA NEGRA ( <i>Phytophthora infestans</i> )	3.0 g/l	60 días
ROSA ( <i>Rosa</i> sp.)	BOTRYTIS ( <i>Botrytis cinerea</i> )	1.25 kg/ha	No aplica
TOMATE RIÑÓN ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )			40 días

\* GASTO DE AGUA: PAPA (*Solanum tuberosum*): 500 l/ha; ROSA (*Rosa* sp.): 1000 l/ha; TOMATE RIÑÓN (*Lycopersicon esculentum*): 450 l/ha

**RESTRICCIONES DE USO:** El producto será utilizado bajo invernadero en el cultivo Rosa (*Rosa* sp.) para el control de Botrytis (*Botrytis cinerea*) y Tomate riñón (*Lycopersicon esculentum*) para el control de Botrytis (*Botrytis cinerea*).

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Papa (*Solanum tuberosum*) se aplica en dos ocasiones en un cultivo ya establecido, cuando se encuentre en crecimiento vegetativo a dos meses de la siembra. Rosa (*Rosa* sp.): se aplica en dos ocasiones en un intervalo de 4 días, en un cultivo ya establecido en estado de floración, botones punto color y sorto, con un 2% de plantas afectadas por la plaga. Tomate riñón (*Lycopersicon esculentum*): se aplica en dos ocasiones dirigida al follaje, después de la primera floración, con una infección de la plaga grado 2 (menor al 5%).

**REINGRESO:** Esperar un mínimo de 12 horas para reingresar al área tratada.

**FITOTOXICIDAD:** El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con otros fungicidas, sin embargo, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación si se requiere hacer la mezcla.

**RESPONSABILIDAD:** “El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

