

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE  
USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE  
LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** "Puede ser letal si es inhalado. No respire el polvo". "Causa irritación moderada a los ojos". "El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas". "Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico". "Cuidado, evite el contacto, posible carcinógeno".

**MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

**"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A SU SALUD Y AL  
AMBIENTE"**

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:** Almacenar en un sitio seguro retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo las condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

**MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:**

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión: No induzca al vómito.

**SÍNTOMAS:** Intoxicación aguda: Es nocivo por ingestión, inhalación y contacto directo. Intoxicación crónica: No se han reportado casos en humanos.

**TRATAMIENTO:** Seguir tratamiento sintomático y de soporte. En caso de ingestión se sugiere realizar un lavado gástrico. **ANTÍDOTO:** No se conoce antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el Paciente al médico y muéstrele la etiqueta".

**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366)**  
Atención las 24 horas del día.  
**SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: (02) 3330555 (QUITO).**  
**CISPROQUIM: 1800-593-005**

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

Este producto puede contaminar el suelo y el agua, siga las siguientes recomendaciones: Tóxico para aves y organismos acuáticos. Producto persistente al suelo, tiene un moderado potencial de lixiviación. No arroje los envases, ni los residuos del producto o de la aplicación al suelo, a fuentes de agua (ríos, acequias, lagos, lagunas) o al sistema de alcantarillado. No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No exceder el número de aplicaciones recomendadas. No aplicar cuando esté lloviendo, en horas soleadas ni cuando existan vientos fuertes. Para aplicación de agroquímicos colocar una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensibles tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. No permita la deriva de este producto. "Este producto es Altamente Tóxico para abejas siga estas recomendaciones: No aplicar ni permitir la deriva de este producto a cultivos o malezas en flor, si las abejas están visitando el área de tratamiento. Alertar de la aplicación en caso de existir granjas apícolas en los alrededores. "Aplicar la dosis recomendada y en horas de inactividad de abejas (en las primeras horas de la tarde)". "Comunicar a los apicultores cercanos al área para que tomen las medidas necesarias antes de la aplicación". "No permitir el ingreso de animales en el área tratada".

# ESPADA

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

### Suspensión Concentrada - SC

Composición	Concentración
Fipronil	200 g/l
Aditivos c.p.s.	11

**Registro Nacional: 080 - I 6 / NA-CL1**

**Contenido Neto: 1 litro**

50ml  
60ml  
100ml  
120ml  
125ml  
250ml  
500ml

**Fecha de formulación:**

**Fecha de vencimiento:**

**Lote No.:**

**P.V.P.**

**Titular de Registro:**

**SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República.  
Edificio: Centrum, Piso 5.  
Teléfono: 023330555 / 025107482.  
Quito - Ecuador.

**Fabricado y Formulado por:**



**Sharda Cropchem Ltd**

Domnic Holm, 29th Road, Bandra(W), Mumbai - 400 050  
Telf: + 91 22 6678 2800  
Fax: + 91 22 6678 2828 / 6678 2808  
E-mail: shardain@vsnl.com  
País: INDIA.

**Importado y Distribuido por:**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**MODO DE ACCIÓN:** ESPADA Insecticida de amplio espectro con moderado poder residual, actúa por contacto e ingestión. Presenta una moderada acción sistémica en algunos cultivos.

**MECANISMO DE ACCIÓN:** Actúa como un potente inhibidor del G.A.B.A. (ácido gama amino butírico) regulador por la vía del cloruro, causando trastornos a nivel del sistema nervioso central. Insectos resistentes o tolerantes a los insecticidas piretroides, ciclodieno, organofosforados y/o carbamatos son susceptibles a fipronil.

**MODO DE EMPLEO:** Vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de ESPADA, en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido. Mantenga en agitación constante. No guardar la mezcla, aplique el mismo día de su preparación

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Plaga	Dosis* (ml/l)	Periodo de Carencia
Rosas (Rosa sp.)	Trips (Frankliniella occidentalis)	0.340	No Aplica
Papa (Solanum tuberosum)	Gusano Blanco (Premnotrypes vorax)	0.875	90 Días
Arroz (Oryza sativa)	Sogata (Sogatodes oryzaicola)	1.25	7 Días
Maíz (Zea mays)	Pulgón (Aphis maidis)	1.0	No aplica
Orlito (Musa acuminata)	Trips (Frankliniella sp. y Frankliniella parvula)	1.0	0 Días

Volumen de agua: \*Rosas: 1300 litros por hectárea; \*Papa: 400 litros por hectárea; \*Arroz: 300 litros por hectárea; \*Maíz: 200 litros por hectárea; \*Orlito: 1 litro por hectárea.

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:**

**Rosas:** Se recomienda aplicar estrictamente con la presencia de la plaga y de acuerdo a los umbrales permitidos en cada finca. La frecuencia de aplicación depende de la incidencia de la plaga. Se recomienda hacer un control para determinar el momento de aplicación. Se recomienda efectuar 2 aplicaciones a un intervalo de 10 días.

**Papa:** se recomienda aplicar estrictamente con el apareamiento de la plaga. La frecuencia de aplicación depende de la incidencia de la plaga, efectuar dos aplicaciones a un intervalo de 45 días.

**Arroz:** se recomienda aplicar estrictamente con la presencia de la plaga (3-10% de plantas atacadas) de acuerdo al umbral económico para la plaga. Se recomienda hacer una sola aplicación.

**Maíz:** se recomienda aplicar estrictamente con la presencia de la plaga (5% de plantas atacadas) de acuerdo al umbral económico para la plaga. Se recomienda hacer una sola aplicación.

**Orlito:** se recomienda una aplicación dirigida por medio de un atomizador a la inflorescencia.

**PERIODO DE REINGRESO:** Esperar un mínimo de 24 horas para reingresar al área tratada.

**FITOTOXICIDAD:** El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con los productos comúnmente usados en los cultivos controlados. Sin embargo, en caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación.

**RESPONSABILIDAD:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:  
II MODERADAMENTE PELIGROSO**

**DAÑINO**

