

GRACIAS

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES — WG

Componentes	Concentración
Azoxystrobin	500 g/kg
Excipientes c.s.p.	1kg

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

REGISTRO NACIONAL: 77 - F 8 / NA

CONTENIDO NETO: 1kg

Lote No.:

Fec ha formulación:

Fec ha vencimiento:

P.V.P.

Titular de Registro:
SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.


Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República.
Edificio: Centrum, Piso 5.
Teléfono: 023330555 / 025107482.
Quito - Ecuador.

Fabricado y Formulado por:



Sharda Cropchem Ltd

Dominic Holm, 29th Road, Bandra(W), Mumbai - 400 050
Telf: + 91 22 6678 2800
Fax: + 91 22 6678 2836 / 6678 2808
E-mail: shardain@vsni.com
País: INDIA



PLAGUICIDAS DE USO AGRICOLA

21 dic 2016

Evelyn P.

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y advertencias de uso y aplicación: "No nocivo por inhalación y por ingestión". "Dañino si se inhala. Evite contacto con la piel y la ropa". "Causa irritación moderada a los ojos".

Medidas relativas a la seguridad: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa, manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios: En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión, no induzca el vómito. SÍNTOMAS: No se conocen síntomas de envenenamiento específicos para este producto. Ingestión: Puede causar náusea, vómito, diarrea, y dolor abdominal. Contacto: Irritación de los ojos, piel y mucosa. Lagrimeo, conjuntivitis, dermatitis de contacto. Inhalación: Alteraciones respiratorias, tos, rinitis. TRATAMIENTO: Ya que los síntomas de intoxicación no son específicos se recomienda efectuar un tratamiento sintomático y de soporte. ANTÍDOTO: No existe antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el Paciente al médico y muéstrele la etiqueta".



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO(836366) Atención las 24 horas del día.
SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA: (02) 3330555 (QUITO).
CISPROQUIM: 1800-593-005

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, colóquelo en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente:

No tirar los residuos por el desagüe; elimine los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Manipule y abra el recipiente con prudencia. No permita el ingreso de animales al área tratada. No arroje los envases, ni los residuos del producto o de la aplicación al suelo, a fuentes de agua (ríos, arroyos, lagos, lagunas) o al sistema de alcantarillado. No exceder el número de aplicaciones recomendadas. Para la aplicación de agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

Instrucciones de uso y manejo: GRACIAS es un fungicida sistémico que pertenece al grupo de los Estrobilurinas, actúa como inhibidor de la respiración mitocondrial en los hongos. **Modo de empleo:** Para la mezcla disolver la dosis indicada de GRACIAS en la mitad del agua requerida, mezcle bien hasta obtener una solución homogénea y sin gránulos, complete el volumen total sin dejar de agitar. Es importante agitar la mezcla antes de cada aplicación. La aplicación se realizará en toda la planta, tratando de cubrir homogéneamente todo el follaje de acuerdo a la dosis específica.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis	PC (Periodo de carencia)
Rosas (<i>Rosa sp.</i>)	Mildiu Polvoso (<i>Oidium sp.</i>)	0.33 g/l; 500 g/ha *	No aplica
Tomate riñon (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0.44 g/l; 175 g/ha *	03 días

*Rosas Volumen de Agua: 1500 litros de agua por hectárea. *Tomate Volumen de Agua: 4000 de agua por hectárea.

Restricción: El producto será utilizado bajo invernadero en el cultivo de rosas (*Rosa sp.*) para el control de Mildiu Polvoso (*Oidium sp.*) y para el cultivo de tomate riñon (*Lycopersicon esculentum*) para el control de tizón temprano (*Alternaria solani*).

Época y frecuencia de aplicación: Se recomienda aplicar el producto GRACIAS con la presencia de la enfermedad. Las aplicaciones no deben exceder de tres, a intervalos de 5 días.

Periodo de reingreso: Esperar un mínimo de 12 horas para reingresar al área tratada.

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendadas en la etiqueta.

Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo se recomienda efectuar pruebas preliminares de compatibilidad a pequeña escala.

Responsabilidad: "El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

