

# NATPAC

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE — WP


Componentes	Concentración
Captan.....	500 g/kg
Excipientes c.s.p.....	1kg

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

REGISTRO NACIONAL: 47 - F 9 / NA

CONTENIDO NETO: 1Kg

Lote No.:  
Fecha formulación:  
Fecha vencimiento:  
P.V.P.



Titular de Registro:

**SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República.  
Edificio: Centrum, Piso 5.  
Teléfono: 023330555 / 025107482.  
Quito – Ecuador.

Fabricado y Formulado por:



**Sharda Cropchem Ltd**

Dominic Holm, 29th Road, Bandra(W), Mumbai - 400 050  
Telf: + 91 22 6678 2800;  
Fax: + 91 22 6678 2828 / 6678 2808  
E-mail: shardain@vsnl.com  
País: INDIA

Importado y Distribuido por:

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

“Nocivo por inhalación y por ingestión”. “Causa irritación a los ojos”. “Este producto es Sensibilizante, cuidado evite el contacto prolongado o repetido, puede causar reacciones alérgicas en algunas personas”. “Cuidado evite el contacto Posible teratógeno”.

**Medidas relativas a la seguridad:** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

Almacenamiento y manejo del producto:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión, no induzca el vómito. SÍNTOMAS: Intoxicación aguda por exposición oral, dérmica e inhalatoria. Síntomas no específicos. Sin embargo puede presentarse náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal. Tos, disnea, aumento de las secreciones mucosas. Irritación de ojos, piel y mucosas. Lagrimeo, conjuntivitis, dermatitis. TRATAMIENTO: Seguir tratamiento sintomático. ANTÍDOTO: No existe antídoto específico.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el Paciente al médico y muéstrele la etiqueta”.



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366)**  
Atención las 24 horas del día.  
**SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: (02) 3330555 (QUITO).**  
**CISPROQUIM: 1800-593-005**

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilicela cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente:

Nocivo para organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático, siga las siguientes recomendaciones: No arroje los envases, ni los residuos del producto o de la aplicación al suelo, a fuentes de agua (ríos, acequias, lagos, lagunas) o al sistema de alcantarillado, No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No exceder el número de aplicaciones recomendadas. No aplicar cuando esté lloviendo, en horas soleadas ni cuando existan vientos fuertes. No permita la deriva de este producto. “Útilice equipo de aplicación en buen estado, para evitar pérdidas y derrames del producto”.

Instrucciones de uso y manejo:

NATPAC es un fungicida no sistémico, de protección y acción curativa, perteneciente al grupo Phthalimida.

**Modo de empleo:** Para la mezcla disolver la dosis indicada de NATPAC en la mitad del agua requerida, mezcle lentamente y añada agua hasta completar el volumen total de acuerdo al cultivo, sin dejar de mezclar. Aplicar en las partes aéreas de la planta, cubriendo en forma homogénea el follaje. Es importante agitar la mezcla antes de cada aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga	Dosis (g/l)	PC (Periodo de carencia)
Rosas ( <i>Rosa</i> sp.)	Mildíu Polvoroso ( <i>Oidium</i> sp.)	1,5	No aplica

\*Volumen de agua: 2200 litros por hectárea

RESTRICCIONES: El producto será utilizado bajo invernadero para el control de Mildíu polvoroso (*Oidium* sp.) en el cultivo de Rosas (*Rosa* sp.).

**Época y frecuencia de aplicación:** Se recomienda aplicar NATPAC con la presencia de la enfermedad. Las aplicaciones no deben exceder de tres, a intervalos de cinco días.

**Periodo de reingreso:** Esperar un mínimo de 12 horas para reingresar al área tratada.

**Fitotoxicidad:** El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendadas en la etiqueta.

**Compatibilidad:** Es compatible con la mayoría de los pesticidas excepto con productos de reacción fuertemente alcalina y aceites. Se recomienda hacer una prueba a pequeña escala para garantizar su compatibilidad.

**Responsabilidad:** “El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO

# CUIDADO

