

SPOOR

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Componentes	Concentración
Ingrediente activo: Atrazine	900 g/Kg
Excipientes c.s.p.	1 Kg

“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Registro Nacional: 2 - H51/NA-CL1

Contenido Neto: 1 kg

Lote No.:
Fecha formulación:
Fecha vencimiento:
PVP:

Titular de Registro:

SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Calle: Inglaterra # E3-54 Intersección: Av. República.
Edificio: Centrum, Piso 5.
Teléfono: 023330555 / 025107482.
Quito – Ecuador.



Fabricado y Formulado por:



Sharda Cropchem Ltd

2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi
Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056
Teléfono: +91 2262615615
E-mail: shardain@vsnl.com
País: INDIA.

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

Causa irritación moderada a los ojos. Cuidado, evite el contacto. POSIBLE CARCINOGENICO

Medidas relativas a la seguridad: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑO A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

Almacenamiento y manejo del producto:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación.- conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese que respire sin dificultad.

En caso de contacto con la piel.- retirese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos.- lávalos con abundante agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión.- No induzca el vómito.

Síntomas: Náuseas, vómitos, diarreas, espasmos musculares, taquicardia, irritación ocular.

Instrucciones para el médico:

Tratamientos: Tratamiento sintomático y de soporte

Antídoto: No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático

*En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta adjunta cuando corresponda.



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.
SHARDA DEL ECUADOR CIA LTDA. A los teléfonos: (02) 3330555 (QUITO).
CISPROQUIM: 1800-593-005

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse.

Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

Medidas relativas para la protección ambiente: No permite animales en el área tratada. Moderadamente tóxico para organismos acuáticos. No arroje los envases, ni los residuos del producto o de la aplicación al suelo, a fuentes de agua (ríos, acequias, lagos, lagunas) o al sistema de alcantarillado. No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No exceder el número de aplicaciones recomendadas. Para la aplicación de agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. No aplicar cuando esté lloviendo, en horas soleadas ni cuando existan vientos fuertes para evitar la deriva. Evite la escorrentía y escurrimiento. En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregados al gestor o distribuidor para su disposición final.

Instrucciones de uso y manejo:

Modo de acción: SPOOR es un herbicida sistémico selectivo. Mecanismo de acción: que se transloca acropetalmente por el xilema y se acumula en el meristema apical, inhibidor de la fotosíntesis, en plantas tolerantes se metaboliza a compuestos no tóxicos.

Modo de empleo: Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de SPOOR, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga	Dosis		Periodo de Carencia	
		Nombre común	Nombre científico		
Maíz (Zea mays)	Malezas	Ortiga	<i>Ficaria vetchiana</i>	2 kg/ha*	NA
		Garrapatilla	<i>Peperomia pellucida</i>		
		Pega-Pega	<i>Bertholletia discolor</i>		
		Amaranto	<i>Amaranthus hybridus</i>		

*Volumen de agua: 300 litros por hectárea.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: La aplicación está en función de la presencia de las malezas; se recomienda efectuarla cuando las malezas tengan de dos a tres hojas verdaderas. Se recomienda efectuar una sola aplicación, de acuerdo a la planificación de cada finca.

REINGRESO: Esperar un mínimo de 12 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola, excepto con sustancias alcalinas y sustancias reductoras. Se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación cuando se requiera mezclar con otro producto.

RESPONSABILIDAD: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

