

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: "No vivo si es ingerido". "Peligroso si es inhalado". Evite respirar polvo, vapor o aspersión". "Cuidado, evite el contacto, posible carcinógeno". "El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas". "Causa irritación de ojos, piel y mucosas".

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación.

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón".

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión: No induzca al vómito.

SÍNTOMAS: irritación de ojos piel y mucosas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, presencia de síntomas muscarínicos o nicotínicos, ataxia, debilidad, parálisis, cefalea, ligera depresión neurológica.

DIAGNÓSTICO: dosaje de la colinesterasa sérica (valores inferiores al 25% del nivel de preexposición indica intoxicación)

TRATAMIENTO Y ANTIDOTO: usar solo si aparecen síntomas de intoxicación. Administrar sulfato de atropina IM ó EV cada 5 o 30 minutos, hasta atropinización leve. Mantener al paciente en reposo y observado mínimo por 24 horas.

CONTRAINDICACIONES: no administre morfina, animofina, tranquilizantes, oximas, leche, sustancias grasas, ni alcohol. Evitar la administración de depresores del SNC y respiratorios. No administrar reactivadores de la colinesterasa

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el Paciente al médico y muéstrele la etiqueta cuando corresponda"

**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.**



**SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.:
(02) 3330555 (Quito). CISPROQUIM: 1800-593-005**

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

"No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación, sobrantes del producto y envases vacíos". "Para la aplicación de agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano".

"No aplique con vientos fuertes para evitar la deriva". "Evite la escorrentía y escurrimiento". "Tóxico para las abejas". "Aplique en el horario de menor actividad de estos organismos, generalmente entre la noche y la mañana". "En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregadas al gestor autorizado".

THIOSEED

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada - SC

Composición	Concentración
Ingrediente activo: Thiodicarb	350 g/l
Aditivos c.s.p.	11

Registro Nacional: 029-19/NA-CL2

Contenido Neto: 1 litro

Lote N°:

Fecha formulación:

Fecha vencimiento:

VVP:



Título de Propiedad de USO AGRICOLA
SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Calle: Inglaterra # 13-54 Interoceánico y Av. Toribiano, Edif. Rec. 3
Teléfono: 023330555 / 025107482.
Quito - Ecuador.

Fabricado y Formulado por:



Sharda Cropchem Ltd

Domno: Holm, 29th Road, Bandra(W), Mumbai - 400 050

Tel: + 91 22 6676 2800

Fax: + 91 22 6676 2826 / 6676 2828

E-mail: shardan@vsnl.com

País: INDIA

Importado y Distribuido por:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MODO DE ACCIÓN: Insecticida con acción predominante acción estomacal, pero también con limitada acción de contacto. Como tratamiento de semillas, translocado rápidamente sistémicamente a través de la planta.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la colinesterasa Bioquímica

MODO DE EMPLEO:

MAÍZ: La aplicación se realiza por impregnación de la semilla antes de la siembra. En funda de plástico de alta densidad colocar la semilla de maíz y añadir la dosis recomendada de THIOSEED, agitar constantemente hasta lograr total cobertura. Dejar secar la semilla bajo sombra por un lapso de 30 minutos. No almacenar la semilla tratada por más de 60 días. Para sembrar usar guantes de nitrilo y mascarilla de protección. Realice el tratamiento y secado de la semilla en sitio apartado de fuentes de agua (al menos 30 metros en zona descubierta y 10 metros en zona con algún tipo de cobertura vegetal) El secado de la semilla tratada se realizará bajo sombra en sitio seguro, ventilado y alejado de colmenas, cultivos en floración o sitios donde exista actividad apícola

PAPA: Agregue la cantidad recomendada del insecticida THIOSEED en la mitad del volumen total del agua requerida, mezcle lentamente y añada la cantidad de agua restante para este fin. Aplicar en las partes aéreas de la planta, cubriendo de forma homogénea el follaje. Es importante agitar la mezcla antes de cada aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (ml/kg semilla)	Periodo de Carencia
MAÍZ (Zea mays)	Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)	20.0 (ml/kg semilla)	No Aplica**
PAPA (Solanum tuberosum)	Trips (Frankliniella tuberosi)	0.75 (l/ha)*	7 días

* PAPA: Volumen de agua por hectárea: 400 litros

** Periodo de carencia (Cultivo de Maíz) no aplica ya que se trata la semilla antes de la siembra

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

MAÍZ: el producto THIOSEED se aplica a la semilla antes de la siembra. Se realiza una sola aplicación para impregnar a la semilla con el producto, dejar secar la semilla y sembrar.

PAPA: Para lograr buenos resultados la aplicación del producto THIOSEED se lo realiza en la parte aérea de las plantas cubriendo en forma homogénea el follaje y con presencia de la plaga. El insecticida debe aplicarse en una sola aplicación.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda esperar mínimo 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con materiales alcalinos, surfactantes aniónicos y materiales que contienen inertes tipo arcilla. En mezcla con otros productos se recomienda hacer previamente una prueba de compatibilidad en pequeña escala.

RESPONSABILIDAD:

"El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II
MODERADAMENTE PELIGROSO**



FRANJA AMARILLA PANTONE -C

DAÑINO

