



Sharda Ecuador

Inglaterra E3-54 y Av. Republica. Ed.  
Centrum. Piso 5. Ofc. 5-C. Telf: 02 333 0555  
e-mail: [ecu\\_reem@shardaintl.com](mailto:ecu_reem@shardaintl.com)  
[d.padilla@shardaintl.com](mailto:d.padilla@shardaintl.com)  
Quito-Ecuadorj



Sharda Cropchem Ltd

2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi  
Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056  
Teléfono: +91 2262615615  
E-mail: [shardain@vsnl.com](mailto:shardain@vsnl.com)  
País: INDIA.

## FICHA TÉCNICA FOLPET 60% + DIMETHOMORPH 11,3%, WG

### ELEFANTE

<b>Nombre de la empresa fabricante</b>	Sharda Cropchem Ltd. 2 <sup>nd</sup> Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West) Mumbai - 400056 País: India
<b>Nombre del ingrediente activo</b>	Folpet + Dimethomorph
<b>Concentración</b>	Contiene 600 gramos de Folpet y 113 gramos de Dimethomorph por kilogramo de producto comercial
<b>Formulación Química</b>	Gránulos Dispersables (WG)
<b>Cultivos</b>	Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> ) Rosa ( <i>Rosa</i> sp.) Tomate Riñón ( <i>Lycopersicum esculentum</i> )
<b>Plagas</b>	Lancha negra ( <i>Phytophthora infestans</i> ) Botrytis ( <i>Botrytis cinerea</i> )
<b>Dosis</b>	3 gramos por litros – Papa 1,25 kilogramos por hectárea – Rosa y Tomate Riñón
<b>Ámbito de aplicación</b>	Se recomienda aplicar ELEFANTE por dos ocasiones en Campo Abierto e Invernadero.
<b>Periodo de carencia</b>	60 días para el cultivo de Papa. 40 días para el cultivo de Tomate Riñón. No aplica para el cultivo de Rosas.
<b>Periodo de reingreso</b>	Esperar mínimo 12 horas después de la aplicación.
<b>Método de aplicación</b>	Su aplicación es foliar y de acuerdo al cultivo. <u>Papa:</u> se debe aplicar en un cultivo ya establecido, cuando se encuentre en crecimiento vegetativo a dos meses de la siembra. <u>Rosa:</u> se lo debe aplicar en un cultivo ya establecido en estado de floración, botones punto color y corte; con un 2% de plantas infestadas, en un intervalo de 4 días. <u>Tomate Riñón:</u> se debe aplicar después de la primera floración con una infección de la plaga grado 2 (menor al 5%).



Sharda Ecuador

Inglaterra E3-54 y Av. Republica. Ed.  
Centrum. Piso 5. Ofc. 5-C. Telf: 02 333 0555  
e-mail: [ecu\\_reny@shardaintl.com](mailto:ecu_reny@shardaintl.com)  
[d.padilla@shardaintl.com](mailto:d.padilla@shardaintl.com)  
Quito-Ecuadorj



Sharda Cropchem Ltd

2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi  
Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056  
Teléfono: +91 2262615615  
E-mail: [shardain@vsnl.com](mailto:shardain@vsnl.com)  
Pais: INDIA.

<b>Método de acción</b>		ELEFANTE es un fungicida sistémico que actúa de manera protectante y posee actividades antiesporulante.
<b>Mecanismo de acción</b>		ELEFANTE inhibe la formación de la pared celular de los hongos oomicetos. Evita la actividad de las enzimas sulfhídricas con lo que se libera tiosfogeno, producto tóxico para el hongo, también interfiere la respiración y el transporte de electrones.
<b>Estado Físico</b>		Sólido
<b>Olor</b>		Característico
<b>Aspecto</b>		Gránulos
<b>Color</b>		Beige
<b>Densidad</b>		1,71 g/cm <sup>3</sup>
<b>pH (20°C)</b>		4,7 AC. 10 g/l
		5,1 AC. 1 g/l
<b>Persistencia en espuma</b>		< 15 ml después de 1 min.
<b>Humectabilidad</b>	<b>Estático</b>	2 seg.
	<b>Dinámica</b>	1 seg.
<b>Propiedades</b>	<b>Explosivas</b>	No explosivo
	<b>Comburentes</b>	No oxidante
<b>Dispersibilidad (1% g/l de agua D)</b>	<b>Entre 0 y 12 meses</b>	98%
	<b>24 meses</b>	97%
<b>Análisis de tamiz seco</b>		1.000 – 2.000 µm
<b>Friabilidad y resistencia de desgaste</b>		99,95%
<b>Estabilidad de almacenamiento</b>		Estable por 2 años bajo condiciones de temperatura 20 ± 2°C.
<b>Compatibilidad</b>		El producto es compatible con otros fungicidas, sin embargo, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación si se requiere hacer la mezcla.
<b>Fitotoxicidad</b>		No muestra fitotóxicidad si es utilizado con las dosis y recomendaciones establecidas en la etiqueta.
<b>Efecto ambiental</b>		Altamente tóxico para los organismos acuáticos. Moderadamente tóxico para las abejas.



Sharda Ecuador

Inglaterra E3-54 y Av. Republica. Ed.  
Centrum. Piso 5. Ofc. S-C. Telf: 02 333 0555  
e-mail: [ecu\\_reny@shardaintl.com](mailto:ecu_reny@shardaintl.com)  
[d.padilla@shardaintl.com](mailto:d.padilla@shardaintl.com)  
Quito-Ecuadorj



Sharda Cropchem Ltd

2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi  
Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056  
Teléfono: +91 2262615615  
E-mail: [shardain@vsnl.com](mailto:shardain@vsnl.com)  
Pais: INDIA.

<b>Toxicidad</b>	<b>TERRESTRE</b>	<b>Aguda vía oral – rata</b>	DL <sub>50</sub> : > 5.000 mg/kg
		<b>Vía dermal – rata</b>	DL <sub>50</sub> : > 2.000 mg/kg
		<b>Aguda por inhalación – rata</b>	CL <sub>50</sub> : > 5,13 mg/l (4 horas)
<b>Irritación aguda</b>		<b>Piel</b>	Moderadamente Irritante
		<b>Ojos</b>	Irritante
<b>Sensibilización cutánea</b>			Sensibilizador en animales
<b>Carcinogenicidad</b>			Posible carcinógeno
<b>Mutagenicidad</b>			Ningún efecto
<b>Teratogenicidad</b>			Ningún efecto
<b>Medidas relativas a primeros auxilios</b>			<p><b>En caso de inhalación</b>, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.</p> <p><b>En caso de contacto con la piel</b>, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.</p> <p><b>En caso de contacto con los ojos</b> lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.</p> <p><b>En caso de ingestión</b>, no induzca el vómito.</p>
 <b>EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366)</b> Atención las 24 horas del día. <b>SHARDA DEL ECUADOR CÍA. LTDA.: (02) 3330555 (QUITO).</b> <b>CISPROQUIM: 1800-593-005</b>			