

Sharda CROPCHEM LIMITED.

Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai 400050, India
Tel: + 91 22 6678 2800, Fax: + 91 22 6678 2828/ 6678 2808
EMAIL: shardain@vsnl.com Website: <http://www.shardaintl.com>
(AN ISO 9002 COMPANY)

FICHA TÉCNICA PRODUCTO FIPIM

Sr. No,										
1.	Nombre de la Compañía Manufacturadora	M/s. Sharda Cropchem Limited. Domnic Holm, 29 th Road, Bandra (W)-400 050 INDIA								
2.	Nombre del Ingrediente Activo	Fipronil + Imidacloprid								
3.	Concentración	25% +25%								
4.	Formulación.	SC								
5.	Plaga y cultivo en el que el producto se va a aplicar	<table border="1"><thead><tr><th>Cultivos</th><th>Pest</th></tr></thead><tbody><tr><td>Potatoes</td><td><i>Premnotrypes vorax</i></td></tr></tbody></table>	Cultivos	Pest	Potatoes	<i>Premnotrypes vorax</i>				
Cultivos	Pest									
Potatoes	<i>Premnotrypes vorax</i>									
6.	Las dosis. (Para el control de la plaga en el cultivo que va a establecer en el protocolo).	<table border="1"><thead><tr><th>Cultivos</th><th>Pesticidas</th><th>Dosis (L/ha)</th><th>Agua por Ha</th></tr></thead><tbody><tr><td>Papa</td><td><i>Premnotrypes vorax</i></td><td>0.300 L/ Ha</td><td>300 L/ Ha</td></tr></tbody></table>	Cultivos	Pesticidas	Dosis (L/ha)	Agua por Ha	Papa	<i>Premnotrypes vorax</i>	0.300 L/ Ha	300 L/ Ha
Cultivos	Pesticidas	Dosis (L/ha)	Agua por Ha							
Papa	<i>Premnotrypes vorax</i>	0.300 L/ Ha	300 L/ Ha							
7.	Ámbito de aplicación. (Inaugurado campo, invernadero, etc.).	Suelo								
8.	Periodo de carencia (PHI). Es el período de tiempo después de la aplicación de plaguicidas a un cultivo durante el cual se prohíbe la cosecha de dicho cultivo. Este intervalo es necesario garantizar que el cultivo se reunirá de las tolerancias de residuos de plaguicidas establecidos.	7 días								
9.	Periodo de reingreso (REI). El período de tiempo después de un campo es tratado con un pesticida durante el cual las restricciones de entrada están en vigor para proteger a las personas contra la exposición potencial a niveles peligrosos de residuos de plaguicidas.	Después 21 días								
10.	Método de aplicación	Rociar en el Suelo								
11.	Modo de Acción	Poco a poco agregue la cantidad necesaria de producto al agua en el tanque con agitación o agitación. Se agita durante la pulverización. Añadir la cantidad requerida de Fipronil 25% + 25% Imidacloprid SC a una pequeña cantidad de agua, lo que garantiza la mezcla completa.								
12.	Mecanismo de acción.	La pulverización del suelo: Aplique como un rocío de difusión a la superficie del suelo y de incorporar a una profundidad de 15								

Sharda CROPCHEM LIMITED.

Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai 400050, India
Tel: + 91 22 6678 2800, Fax: + 91 22 6678 2828/ 6678 2808
EMAIL: shardain@vsnl.com Website: <http://www.shardaintl.com>
(AN ISO 9002 COMPANY)

		cm antes de la siembra.
13.	Compatibilidad	El fipronil 25% + 25% Imidacloprid SC es compatible con propineb, bitertanol o metamidofos. No mezclar concentrados juntos, pero cada uno añada al tanque de pulverización por separado,
14.	Toxicidad	
a.	Toxicidad oral aguda	LD50 rat >1999 mg/kg
b.	Toxicidad dérmica aguda	LD50/oral/rat:> 2000 mg / kg
c.	Toxicidad aguda por inhalación	LC50/inhalation/rata:1.7 mg / l (4h)
d.	Irritación dérmica aguda:	ligeramente irritante
e.	Irritación ocular aguda:	ligeramente irritante
f.	Sensibilización de la piel:	efecto no sensibilizante.